



「2025. 02. 07」

农业气象周报

研究员：柳瑜萍

期货从业资格证号 F0308127

期货投资咨询从业证书号 Z0012251

联系电话：0595-86778969


关注我们
获取更多资讯




业务咨询
添加客服



目录



1、周度重点气象




2、各农作物产区气象

「周度重点关注气象」

- ◆ 国内天气利于作物生长。
- ◆ 美豆新作收获结束，丰产落地。巴西大豆播种结束，未来15天，巴西中西部大豆产区降雨分布不均，巴拉那州、马托格罗索州、南马托格罗索州部分降雨高于常值，巴拉那州、南里奥格兰德州大部分地区降雨低于正常水平；产区温度几乎正常，南里奥格兰德州气温高于常值。巴拉那州、马托格罗索州降雨可能影响早植大豆收获，南里奥格兰德州高温少雨可能对作物生长产生影响。阿根廷大豆播种结束，作物评级持续下降，不过土壤水分状况有所改善，只是仍差于去年同期。未来15天，阿根廷大豆产区下周中11日后迎来降雨，降雨改善作物生长，不过分布不均，中部部分产区降雨量仍低于常值，温度高于常值。
- ◆ 加拿大油菜籽收获结束。欧盟油菜籽处于生长期，未来15天欧洲大部分主产区南部降雨良好，北部降雨低于正常值，关注北部地区降雨情况，气温正常或略高于常值。
- ◆ 马来西亚加里曼丹岛北部降雨较多，当地棕榈油产量约占马来西亚50%，对棕榈油的收购和采摘有不利影响；马来西亚和印尼其他地区降雨低于正常值，有利于采摘。
- ◆ 12月至次年2月拉尼娜发生概率为94%，拉尼娜发生概率变高。过往情况看，拉尼娜有一定概率会造成美国、南美大豆产量减少，棕榈油恢复生产，白糖减产。

各产区生长期

图 大豆主产区



东北地区（含内蒙古）大豆产量超总产量60%，**目前大豆收获结束。**


黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）大豆产量占总产量15%以上，**目前大豆收获结束。**

来源：重点农产品市场信息平台

「大豆周度气象分析」

降水量——收获结束

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北产区	收获结束 (60%)	
黄淮海产区	收获结束 (15%)	

「大豆周度气象分析」

气温——收获结束

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台

产区

生长期及适合温度

目前温度及影响

收获结束
东北产区


收获结束
黄淮海产区

「大豆周度气象分析」



美国大豆主产区及生长期

图 美国大豆主产区




美国大豆产区集中在中部，包括爱荷华州、伊利诺斯州、明尼苏达州、内布拉斯加州、印第安纳州等，
大豆收获结束。

来源：USDA

巴西大豆主产区及生长期

图 巴西大豆主产区



巴西大豆产区集中在中西部，在马托格罗索州（28%）、巴拉那州（13%）、南里奥格兰德州（11%）、戈亚斯州（11%）、南马托格罗索州（9%）。


巴西新作大豆生长中，部分进入收获阶段。截至2月2日，巴西24/25年度大豆播种率为99.4%，上周公布值为99.2%，去年同期99.6%，收获进度为8.0%，上周公布值为3.2%，去年同期14.0%。

已种植大豆6.4%处于萌发期，上周值8.5%，13.8%处于开花期，44.4%处于灌浆期，27.2%处于成熟期，8.0%处于收获期。

来源：USDA

降水量、温度——部分降雨较多地区可能有碍大豆收获


图 巴西未来15天降水距平（%）



来源：世界农业展望局

未来15天，巴西中西部大豆产区降雨分布不均，巴拉那州、马托格罗索州、南马托格罗索州部分降雨高于常值，巴拉那州、南里奥格兰德州大部分地区降雨低于正常水平；产区温度几乎正常，南里奥格兰德州气温高于常值。巴拉那州、马托格罗索州降雨可能影响早植大豆收获，南里奥格兰德州高温少雨可能对作物生长产生影响。


图3、巴西未来15天温度距平（°F）



来源：世界农业展望局

阿根廷大豆主产区及生长期

图 阿根廷大豆主产区



阿根廷大豆产区集中在中部，布宜诺斯艾利斯省（31%）、科尔多瓦省（28%）、圣菲省（19%）、圣地亚哥-德尔埃斯特罗省（9%）。约占世界产量的12%


截至2月5日，大豆作物状况评级良好占比17%(上周值20%，去年同期值31%)，正常占比51%（上周值52%，去年同期值50%），较差占比32%(上周值28%，去年同期值19%)。

土壤水分有益到适宜占比64%(上周值58%，去年同期值72%)，短缺到极度短缺占比36%(上周值42%，去年同期28%)。

来源：USDA

降水量、温度——部分地区迎来降雨，改善作物生长


图 阿根廷未来15天降水距平（%）



来源：世界农业展望局

未来15天，阿根廷大豆产区下周中11日后迎来降雨，不过分布不均，中部部分产区降雨量仍低于常值，温度高于常值，降雨改善作物生长。


图3、阿根廷未来15天温度距平（°F）



来源：世界农业展望局

各产区生长期

图 油菜籽主产区



西北、华北地区种植春油菜，油菜籽产量约占总产量10%，收获结束。


长江中下游地区种植冬油菜，油菜籽产量约占总产量50%，处于现蕾抽薹期。

西南地区种植冬油菜，油菜籽产量占总产量35%以上，处于现蕾抽薹期。

来源：重点农产品市场信息平台

降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
西北、华北产区 (10%, 春)	收获结束	
长江中下游产区 (50%, 冬)	苗期至现蕾抽薹期	条件适宜
西南产区 (35%, 冬)	苗期至现蕾抽薹期	条件适宜

「油菜籽周度气象分析」

气温——条件适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
西北、华北产区 (10%, 春)	收获结束	
长江中下游产区 (50%, 冬)	苗期至现蕾抽薹期	条件适宜
西南产区 (35%, 冬)	苗期至现蕾抽薹期	条件适宜

「油菜籽月度气象分析」

加拿大菜籽主产区及生长期

图 加拿大菜籽主产区




加拿大菜籽集中在草原三省（阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省）种植。收获结束

来源：USDA

「油菜籽月度气象分析」

欧盟菜籽主产区及生长期

图 欧盟菜籽主产区




欧盟的油菜种植区域主要分布在法国（21%）、德国（21%）、波兰（18%）、罗马尼亚（6%）等国。目前处于生长期

来源：USDA

温度、降水量——主产降雨分布不均，北部降雨低于正常值


图 未来15天降水距平（%）



来源：世界农业展望局

未来15天欧洲大部分主产区南部降雨良好，北部降雨低于正常值，关注北部地区降雨情况，气温正常或略高于常值。


图 未来15天温度距平



来源：世界农业展望局

印度尼西亚主产区

图 印度尼西亚棕榈油主产区



印尼棕榈油主产区为苏门答腊岛和加里曼丹岛。

来源：USDA

马来西亚主产区

图 马来西亚棕榈油主产区




来源：MPOB

马来西亚棕榈油产区集中在沙捞越、沙巴、彭亨、柔佛、霹雳五个州，其中沙巴和沙捞越加起来产量超50%。


降水量——加里曼丹岛北部降雨较多，对棕榈油的收购和采摘有不利影响

图 东南亚未来一周降水



来源: CPC

图 东南亚未来一周降水距平




来源: CPC

马来西亚加里曼丹岛北部降雨较多，当地棕榈油产量约占马来西亚50%，对棕榈油的收购和采摘有不利影响；马来西亚和印尼其他地区降雨低于正常值，有利于采摘

「棕榈油周度气象分析」

厄尔尼诺&拉尼娜——12月至次年2月发生拉尼娜概率为94%


图 ENSO预测（1月）



来源：IRI

12月至次年2月拉尼娜发生概率94%，次年1月至3月发生概率为83%。

图 不同模型对ENSO指数的预测（1月）




来源：IRI

「玉米周度气象分析」

各产区生长期

图 玉米主产区



东北地区（含内蒙古）种植春玉米，产量超总产量40%，收获结束。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）种植夏玉米，产量占总产量30%以上，收获结束。


西南地区玉米产量占总产量10%左右，收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

「玉米周度气象分析」

降水量——收获结束

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北产区 (40%)	收获结束	
黄淮海产区 (30%)	收获结束	
西南产区 (10%)	收获结束	

「玉米周度气象分析」

气温——条件适宜

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台

产区 生长期及适合温度 目前温度及影响

东北产区 收获结束

(40%)

黄淮海产区 收获结束


(30%)

西南产区 收获结束

(10%)

各产区生长期

图 棉花主产区



新疆棉花产量约占总产量90%，收获基本结束。


黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）棉花产量占总产量6%左右，收获基本结束。

来源：重点农产品市场信息平台

「棉花周度气象分析」

降水量——收获结束

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆	收获结束 (90%)	
黄淮海产区	收获结束 (6%)	

「棉花周度气象分析」

气温——收获结束

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台


产区 生长期及适合温度条件 目前条件及影响

新疆 收获结束
(90%)

黄淮海产区 收获结束
(6%)

各产区生长期

图 苹果主产区




渤海湾产区（山东、辽宁、河北、北京、天津）苹果产量约占总产量33%，收获结束。

西北黄土高原区（陕西渭北地区、山西晋南和晋中、河南三门峡地区、新疆和甘肃的陇东地区）苹果产量约占总产量60%，收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

降水量——收获结束

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
渤海湾产区	收获结束 (33%)	
西北黄土高原	收获结束 (60%)	

「苹果周度气象分析」

气温——条件适宜

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台

产区 生长期及适合温度条件 目前条件及影响


渤海湾产区
(33%)
收获结束

西北黄土高原
(60%)
收获结束

「红枣周度气象分析」

各产区生长期

图 红枣主产区



新疆红枣产量约占总产量50%，目前枣树收获结束。

黄土高原区（山西、陕西）红枣产量占总产量20%以上，目前枣树收获结束。


黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）红枣产量占总产量20%以上，目前枣树收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

「红枣周度气象分析」

降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆 (50%)	收获结束	
黄土高原区 (20%)	收获结束	
黄淮海产区 (20%)	收获结束	

「红枣周度气象分析」

气温——条件适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
新疆 (50%)	收获结束	
黄土高原区 (20%)	收获结束	
黄淮海产区 (20%)	收获结束	

各产区生长期

图 甘蔗主产区




广西、云南、广东甘蔗产量分别占总产量的
68.6%、14.8%、12.6%，处于收获期。

来源：重点农产品市场信息平台

降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
广西 (68.6%)	收获期	条件适宜
云南 (14.8%)	收获期	条件适宜
广东 (12.6%)	收获期	条件适宜

「甘蔗周度气象分析」

气温——温度适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
广西 (68.6%)	收获期	温度适宜。
云南 (14.8%)	收获期	温度适宜。
广东 (12.6%)	收获期	温度适宜。

各产区生长期

图 甜菜主产区



新疆甜菜产量约占总产量39%，多为春播，收获结束。


华北地区甜菜产量约占总产量57%，多为春播，收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

「甜菜周度气象分析」

降水量——收获结束

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆	收获结束 (39%)	
华北产区	收获结束 (57%)	

「甜菜周度气象分析」

气温——收获结束

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台

产区 生长期及适合温度条件 目前条件及影响

新疆 收获结束


(39%)

华北产区 收获结束

(57%)

各产区生长期

图 花生主产区



东北地区花生产量约占总产量10%，目前花生收获结束。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）花生产量占总产量60%以上，目前春花生收获期结束，夏花生处于收获结束。


华南产区花生产量占总产量10%以上，目前春花生收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

「花生周度气象分析」

降水量——收获结束

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北产区 (10%)	收获结束	
黄淮海产区 (60%)	春花生收获期结束，夏花生收获结束	
华南产区 (10%)	收获结束	

「花生周度气象分析」

气温——收获结束

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区 生长期及适合温度条件 目前条件及影响

东北产区 (10%, 春)	收获结束	
黄淮海产区 (60%)	春花生收获期结束，夏花生处于收获结束。	
华南产区 (10%)	收获结束	

各产区生长期

图 小麦主产区




西北地区小麦产量约占总产量10%以上，主要种植春小麦，目前收获结束。冬小麦处于越冬期。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）小麦产量占总产量80%以上，主要种植冬小麦，处于越冬期。

来源：重点农产品市场信息平台

降水量——适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
西北产区	冬小麦处于越冬期 (10%, 春)	条件适宜
黄淮海产区	冬小麦处于越冬期 (80%, 冬)	条件适宜

「小麦周度气象分析」

温度——条件适宜

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台


产区 生长期及适合温度条件 目前条件及影响

西北产区 冬小麦处于越冬期 条件适宜
(10%, 春)

黄淮海产区 冬小麦处于越冬期 条件适宜
(80%, 冬)

各产区生长期

图 稻谷主产区



东北地区种植粳稻，一年一季，产量约占总产量20%，收获结束。

长江中下游地区单双季稻并存，产量占总产量40%以上，早稻收获结束，晚稻处于收获期。

西南地区以单季两熟稻为主，籼、梗稻并存，产量约占总产量14%，一季稻收获结束。


华南地区种植双季籼稻，一年多熟，产量约占总产量12.5%，早稻收获期结束。晚稻处于收获期。

来源：重点农产品市场信息平台

「稻谷周度气象分析」

降水量——收获结束

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北	收获结束	
	(20%)	
长江中下游	收获结束	
	(40%)	
西南	收获结束	
	(14%)	
华南	收获结束	
	(12.5%)	

「稻谷周度气象分析」

气温——收获结束

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台

产区

生长期及适合温度条件

目前条件及影响

东北

(20%)

收获结束

长江中下游

(40%)

收获结束

西南

(14%)

收获结束

华南

(12.5%)

收获结束



免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

瑞达期货研究院简介

瑞达期货股份有限公司创建于1993年，目前在全国设立40多家分支机构，覆盖全国主要经济地区，是国内大型全牌照期货公司之一，是目前国内拥有分支机构多、运行规范、管理先进的专业期货经营机构。2012年12月完成股份制改制工作，并于2019年9月5日成功在深圳证券交易所挂牌上市，成为深交所期货第一股、是第二家登陆A股的期货上市公司。

研究院拥有完善的报告体系，除针对客户的个性化需要提供的投资报告和套利、套保操作方案外，还有晨会纪要、品种日评、周报、月报等策略分析报告。研究院现有特色产品有短信通、套利通、市场资金追踪、持仓分析系统、投顾策略、交易诊断系统、数据管理系统以及金尝发服务体系专供策略产品等。在创新业务方面，积极参与创新业务的前期产品研究，为创新业务培养大量专业人员，成为公司的信息数据中心、产品策略中心和人才储备中心。

瑞达期货研究院将继往开来，向更深更广的投资领域推进，为客户的期货投资奉上贴心、专业、高效的优质服务。